



La sonde

La sonde de **jéjunostomie** permet d'administrer des **nutriments**, des **liquides** ou des **médicaments** dans l'intestin/le jéjunum.



Les complications



Complications qui nécessitent une prise en charge dans l'heure suivant leur apparition :

- **Chute** de la sonde
- Présence d'une **douleur abdominale** au passage du produit



En cas de survenue : **contacter les urgences / se rendre aux urgences**



Complications qui nécessitent une prise en charge dans les 24h suivant leur apparition :

- **douleur**
- **trouble cutané**
- **trouble hépatique** (cholestase)
- **écoulement**
- **obstruction** de la sonde
- **mobilisation** de la sonde
- problème de fixation de la sonde
- embout cassé



En cas de survenue en journée : **contacter les consultations**



En cas de survenue la nuit : **contacter le service**



Ne pas contacter
les urgences ni s'y
rendre




Le rinçage de la sonde



Avant et après chaque utilisation **ou, régulièrement** lorsque la sonde n'est pas utilisée




Rinçage à l'eau du robinet avec une **seringue ENFit** de 60mL



La post-utilisation de la sonde


Une fois la sonde utilisée : la **ranger** et la **fixer** sur le ventre avec un **sparadrap**



Le fixateur de sonde



- Le fixateur de sonde **se change en consultation** excepté s'il est sale ou s'il se décolle.
- Cela pourra alors être fait par l'**IDE du prestataire**,



Symptômes liés à l'utilisation de la sonde

Les **symptômes** peuvent être :

- **Satiété**
- **Nausées**
- **Diarrhées**



En cas d'apparition : **contacter le prestataire** (le plus souvent une adaptation du débit ou une modification du liquide entérale permet la disparition de ces symptômes)